

Pflanzliste A: Ökologisch wertvolle Laubbäume

| Name (dt.) | Name (bot.) | Höhe (m) | Besonderheiten |
|---|---|-------------|---|
| Kleine bis mittlere Bäume, für kleinere Gärten/ Stellplätze geeignet | | | |
| Feldahorn | <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk' | 8-12 | aufrechter, schlankerer Wuchs, mehltaufrei |
| Feldahorn | <i>Acer campestre</i> | 8-12 | Schmaler Wuchs, für räumlich beengte Verhältnisse |
| Säulen-Ahorn | <i>Acer platanoides</i> 'Columnare' | 8-10 | kleinwüchsige Sorte; schmale, spitzenkegelförmige Krone |
| Kugel-Ahorn | <i>Acer platanoides</i> 'Globosum' | 5-10 | kleinwüchsige Sorte; kugelige Krone, langsam wachsend |
| Säulen-Hainbuche | <i>Carpinus betulus</i> 'Frans Fontaine' | bis 12 | Sorte mit schlankem Säulenwuchs; behält im Alter auch ohne Schnitt schmale Form |
| Echter Rotdorn | <i>Crataegus laevigata</i> | 5-7 | Kalk liebend, verträgt alle Böden |
| Weißdorn | <i>Crataegus monogyna</i> | 5-7 | Kalk liebend, verträgt alle Böden |
| Säulen-Weißdorn | <i>Crataegus monogyna</i> 'Stricta' | 4-6 | Kleiner, schlanker Baum |
| Kornelkirsche | <i>Cornus mas</i> | 4-7 | kleiner Baum/ Großstrauch, robust, gelbe Blüte, Blüte zeitiges Frühjahr, essbare Früchte (Marmelade), Nahrungsquelle für Insekten |
| Kugelesche | <i>Fraxinus excelsior</i> 'Nana' | 4-6 | Kleinbaum, kugelig wachsend |
| Holzapfel | <i>Malus sylvestris</i> | 6-8 | anspruchlos und anpassungsfähig |
| Zierapfel | <i>Malus</i> in Sorten | 5-7 | kleiner Baum, üppige Blüte, kleine Früchte |
| Mispel | <i>Mespilus germanica</i> | 3-5 | Großstrauch/kleiner Baum, Frucht nach dem ersten Frost essbar |
| Wildbirne | <i>Pyrus communis</i> "Beech Hill" | 6-8 | kleiner Baum, anspruchslos |
| Kugelakazie | <i>Robinia pseudoakacia</i> 'Umbraculifera' | 4-6 | kleiner kugeliges Baum, |
| Echte Mehlbeere | <i>Sorbus aria</i> | 6-15 | Laub unterseitig grau/weiß, Früchte |
| Silber Mehlbeere | <i>Sorbus incana</i> | 7-9 | kleiner Baum, eiförmige Krone, helle Blattunterseite, verträgt Strahlungshitze |

bitte wenden

| Mittelgroße Bäume 10m - 20m | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|---|
| Spitz-Ahorn | Acer platanoides 'Cleveland' | 12-15 | auffallender Blütenbaum , schlanker, wie die Art, schöne orange-gelbe Herbstfärbung |
| Hainbuche | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | 12 | Sehr schlanke Krone |
| Wildbirne 'Chanticleer' | Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 12 | Krone schmal spitzkegelig, Frucht 1,5cm |
| Vogel-Kirsche | Prunus avium | 15-20 | Blüten- und Fruchtbaum |
| Traubenkirsche | <i>Prunus padus</i> | 10-15 | weiße Traubenblüten, auffallend |
| Gemeine Eberesche, echte Vogelbeere | <i>Sorbus aucuparia</i> | 10-15 | Nahrungsquelle für viele Tierarten (Blatt, Blüte, Früchte), schöne Herbstfärbung |
| Speierling | Sorbus domestica | 10-18 | essbare Früchte (nach erstem Frost); intensiver Duft, sehr langsamwachsend |
| Elsbeere | Sorbus torminalis | 15-20 | Krone pyramidal bis rundlich |
| Stadt-Linde | Tilia cordata 'Greenspire' | 15-20 | sehr gut für innerstädt. Klima geeignet |
| Winter-Linde 'Rancho' | Tilia cordata 'Rancho' | 10-15 | Blüte tropft nicht, auch für städtischen Bereich geeignet |
| Sommerlinde | Tilia platyphyllos 'Örebro' | bis 15 | für innerstädtisches Klima besser geeignet, als die Art |

| Große Bäume über 20m - benötigen viel Platz | | | |
|---|---------------------|-------|--|
| Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus | 20-40 | Krone breit und sehr ausladend; verträgt innerstädtisches Klima schlecht |
| Weiß-Birke | Betula pendula | 20-30 | schlanke Krone, Vorsicht Pollen |
| Gemeine Esche | Fraxinus excelsior | 30-40 | breitpyramidale Kronenform, Pioniergehölz, Vorsicht wegen Eschentriebsterben |
| Trauben-Eiche | Quercus petraea | 30-40 | nährstoffarme, trockene Böden; für Stadtklima geeignet |
| Stiel-Eiche | Quercus robur | 20-30 | nährstoffreiche Lehm- und Tonböden, für Stadtklima geeignet |
| Winter-Linde | Tilia cordata | 15-25 | verträgt innerstädtisches Klima schlecht, wohlriechende Blüten |
| Feld-Ulme | Ulmus carpinifolia | 30-40 | schnell wachsend; feuchte Lehmböden, für innerstädtisches Klima ungeeignet |
| Berg-Ulme | Ulmus glabra | 30-40 | feuchte Ton-/Lehmböden; für innerstädtisches Klima ungeeignet |

Bemerkungen

Bei Pflanzungen im Siedlungsbereich empfiehlt es sich ggf. einen Wurzelvorhang o.ä. einzubauen, um die Wurzeln zu lenken und beispielsweise den Wuchs in Abwasserrohre auszuschließen.

Die maximalen Wuchshöhen sind abhängig vom Standort (Boden, Wasser, Klima) und können innerhalb Arten variieren.

Das Anpflanzen großwüchsiger Nadelgehölze wie Tanne und Fichte sowie deren schwachwüchsiger Gartenformen ist nicht als Ersatzpflanzung zulässig.

Pflanzliste B: Obstbäume

| Name (dt.) | Reife | Größe Frucht | Farbe | Geschmack | Erntereif |
|------------|-------|-----------------|-------|-----------|-----------|
|------------|-------|-----------------|-------|-----------|-----------|

Apfelbäume: Höhe bis 10m; Krone breit elliptisch; Flachwurzler

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Retina | <i>früh</i> | groß | dunkelrot | saftig, süßsauerlich | ab Ende August |
| Nela | <i>früh</i> | mittel | rotgelb | saftig, säuerlich, schwach aromatisch | ab Mitte August |
| Hana | <i>früh</i> | mittel | grün-braunrot | saftig, säuerlich | Anfang bis Mitte August |
| Piros | <i>früh</i> | mittel | rot | saftig, süßsauerlich | August |
| Starks Earliest | <i>früh</i> | mittel | hellgelb-rot | saftig mildsäuerlich | Mitte Juli bis August |
| Weißer Klarapfel | <i>früh</i> | mittel | gelblich grün | feinsäuerlich, würzig | Ende Juli |
| Gerlinde | <i>mittelfrüh</i> | mittel | rotgelb | süßsauerlich | Mitte September bis Ende November |
| Böhmer Cox | <i>mittelfrüh</i> | groß | mittel-dunkelrot | süß-säuerlich aromatisch | Mitte September bis Ende Oktober |
| Rebella | <i>mittelfrüh</i> | mittelgroß | hellrot | süß, leicht säuerlich, fruchtig | Mitte bis Ende September |
| Rubinola | <i>mittelfrüh</i> | mittelgroß | leuchtend rot | fein würzig, süß-säuerlich | ab Mitte September |
| Alkmene | <i>mittelfrüh</i> | mittel | grün/gelb; Sonnenseite rot | leicht säuerlich; aromatisch | Anfang September bis Ende November |
| James Grieve | <i>mittelfrüh</i> | mittel | gelblich; Sonnenseite orange | feine Säure; würzig | Mitte August bis Ende Oktober |
| Berlepsch | <i>mittelfrüh</i> | mittel | rot und goldgelb | säuerlich-frisch; würzig; hoher Vitamin-C-Gehalt | November bis März |
| Gravensteiner | <i>mittelfrüh</i> | groß | karminrot und gelb | süßsauer; aromatisch | September bis November |
| Geheimrat Oldenburg | <i>mittelfrüh</i> | mittel | grüngelb und orangerot | mildsäuerlich | September bis November |
| Topaz | <i>spät</i> | mittelgroß | gelborange - orangerot gestreift | süßsauerlich; fest | Ende September bis Anfang März |
| Florina | <i>spät</i> | mittelgroß | rot, leicht grüner Streifen | süßlich, fein säuerlich | Ab Ende September |
| Otava | <i>spät</i> | mittegroß | gelbgrün | feinsäuerlich, aromatisch | Ab Mitte Oktober |
| Ariwa | <i>spät</i> | mittelgroß | orange- dunkelrot | harmonisch süßsauer | Mitte bis Ende September |
| Rosana | <i>spät</i> | mittelgroß | dunkelrot punktiert und geflammt | süß, leicht säuerlich, aromatisch | A Mitte September |
| Rajka | <i>spät</i> | mittegroß | grüngelb und dunkelrot | süß, aromatisch, leicht säuerlich | Mitte bis Ende September |
| Ontario | <i>spät</i> | groß | gelbgrün und braunrot | säuerlich-fruchtig | Januar bis Mai |
| Brettacher | <i>spät</i> | groß | grünlich,teils leicht rot | saftig | Mitte Oktober bis März |
| Boskoop rot | <i>spät</i> | groß bis sehr groß | orange- dunkelrot | kräftig fruchtig, säuerlich; würzig erfrischend | Dezember bis April |
| Glockenapfel | <i>spät</i> | groß | grüngelblich | frische Säure | Ab Oktober |
| Zuccalmaglio | <i>spät</i> | mittelklein | gelb-leicht orange | saftig, fein aromatisch | Ab Ende September |

Bitte wenden!

| Name (dt.) | Reife | Größe Frucht | Farbe | Geschmack | Erntereif |
|------------|-------|--------------|-------|-----------|-----------|
|------------|-------|--------------|-------|-----------|-----------|

Birnbäume: Höhe bis 20m; Herzwurzler

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Clapps Liebling | Frühsorte | mittel | gelbgrünlich; sonnenseits rötlich | süßsauer; schwach würzig | Mitte August bis Mitte September |
| Frühe von Trevoux | Frühsorte | groß | gelb-rot | saftig; fein säuerlich, würzig | August bis Anfang September |
| Bunte Julibirne | Frühsorte | mittelgroß | gelbgrün, berostet | gelbweiß; süßsäuerlich | Mitte Juli bis Anfang August |
| Gute Luise | Mittelfrühe Sorte | mittel | gelb-orange-rötlich | süß, leicht säuerlich, aromatisch | September bis Oktober |
| Conference | Mittelfrühe Sorte | mittel | hellgelb | süß, aromatisch, schmelzend | Oktober bis November |
| Madame Favre | Mittelfrühe Sorte | mittel | grün | süß-säuerlich, schwach würzig | Mitte bis Ende August |
| Gellerts Butterbirne | Mittelfrühe Sorte | mittel bis groß | gelbbraun; bronze berostet | saftig; süßlich würzig | Ende September bis Anfang Oktober |
| Köstliche aus Charneux | Mittelfrühe Sorte | mittel | grüngelb | saftig, weinsäuerlich, aromatisch | Mitte Oktober bis Anfang Dezember |
| Winterforelle | Spätsorte | groß | grüngelb-rot | saftig, süß, mild | Ab Anfang Oktober |
| Gräfin von Paris | Spätsorte | mittel bis groß | grüngelb; dicht punktiert | herb, schwach aromatisch | Ende Oktober bis Anfang Januar |
| Alexander Lucas | Spätsorte | groß | grüngelb; berostete Punkte | süßaromatisch, saftig | Anfang November bis Ende Dezember |
| Vereinsdechant | Spätsorte | mittelgroß | gelb; sonnenseits rötlich | süß, saftig | Ende Oktober bis Ende November |

Süßkirschen: Höhe bis 20m; Herzwurzler

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| Schneiders späte Knorbel | Spätsorte | groß | schwarzrot | würzig, saftig, feinsüß | Mitte Juli bis Anfang August |
| Hedelfinger | Frühsorte | groß | hellrot | saftig-wohlschmeckend | Anfang bis Mitte Juli |
| Große schwarze Knorbelkirsche | mittelfrühe Sorte | groß | dunkelbraun-rot | fest, saftig, angenehm | Mitte Juli bis Ende Juli |
| Regina | Spätsorte | groß | rotbraun | aromatisch | Ende Juli bis Ende August |
| Star | | mittel | braunschwarz | | |
| Sam | mittelfrühe Sorte | mittel | rotbraun | fest, saftig, angenehm | Mitte Juli bis Ende Juli |
| Burlat | Frühsorte | groß | dunkelrot | fest, saftig, angenehm | Anfang bis Mitte Juni |
| Untertländer | mittelfrühe Sorte | groß | dunkelrot | aromatisch süß, würzig | Mitte bis Ende Juli |
| Adlerkirsche von Bärtschi | mittelspäte Sorte | groß | dunkelrotbraun | süßsäuerlich, würzig | Ende Juli bis Anfang August |

Bitte wenden!

| Name (dt.) | Reife | Größe Frucht | Farbe | Geschmack | Erntereif |
|------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Schattenmorelle | Spätsorte | groß | dunkelrot | säuerlich | Ende Juli bis Anfang August |
| Koröser Weichsel | mittelfrühe Sorte | groß | dunkelrot- schwarzbraun | süßsauerlich, aromatisch | Juli-August |
| Morellenfeuer | Spätsorte | mittel | dunkelrot | säuerlich, fein aromatisch | Juli |

Zwetschgen und Pflaumen: Höhe bis 8m; Flachwurzler

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Graf Althanns | mittelfrühe Sorte | groß-sehr groß | blaurot bereift | sehr saftig | Mitte August bis Anfang September |
| Reneklote | Spätsorte | mittel | grüngelblich; rot punktiert | sehr saftig, süß | Ende August bis Anfang September |
| Hanita | mittelspäte Sorte | mittel | dunkelblau; bereift | saftig aromatisch; süßsauerlich | Ende August bis Mitte September |
| Mirabelle von Nancy | mittelfrühe Sorte | klein | zitronengelb; rötlich punktiert | würzig süß | Mitte bis Ende August |
| Hauszwetschge | Spätsorte | mittel | tiefblau, bereift | feine süße, erfrischende Säure | September bis Anfang Oktober |
| Cacaks Fruchtbare | Spätsorte | mittel | dunkelblau | süßsauerlich | Ende August |
| Ontariopflaume | mittelfrühe Sorte | groß | grüngelblich | süß, schwach aromatisch | August |
| Kirkespflaume | mittelspäte Sorte | mittel | blau bereift | saftig würzig, süßsauerlich | Ende August bis Mitte September |
| Katinka | Frühsorte | mittel | dunkelblau bereift | aromatisch | Mitte bis Ende Juli |

Walnuss: 7-8m Kronenbreite; Pfahlwurzler

| | | | | | |
|-------------|----------------------|------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| Weinsberg 1 | mittelfrühe Sorte | groß | helles goldbraun | wohlschmeckend | Mitte September bis Anfang Oktober |
|-------------|----------------------|------|------------------|----------------|---------------------------------------|

Pflanzliste C: Sträucher

| Name (dt.) | Name (Lat.) | Höhe (m) | Besonderheiten |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Einheimische Sträucher und Heckengehölze | | | |
| Felsenbirne | <i>Amelanchier ovalis</i> | 5-7m | anspruchlos |
| Hainbuche | <i>Carpinus betulus</i> | bis 25 | sandig-humose Lehmböden; sehr gut schnittberträglich |
| Kornelkirsche | <i>Cornus mas</i> | 5-7m | mäßig trockene Lehm-/Humusböden; gut schnittverträglich |
| Roter Hartriegel | <i>Cornus sanguinea</i> | 3-4m | frische, sandig-steinige Lehm-/Tonböden; starken Rückschnitt gut vertragend |
| Haselnuss | <i>Corylus avellana</i> | 4-6m | mäßig trockene Lehm-/Humusböden; gut schnittverträglich |
| Zweigrifflicher Weißdorn | <i>Crataegus laevigata</i> | bis 10m | lockere, humose Schutt-/Lehmböden; radikalen Verjüngungsschnitt gut vertragend |
| Eingrifflicher Weißdorn | <i>Crataegus monogyna</i> | 4-6m | lockere, humose Schutt-/Lehmböden; radikalen Verjüngungsschnitt gut vertragend |
| Pfaffenhütchen | <i>Euonymus europaeus</i> | 2-6m (häufig nur bis 3m) | frisch-feuchte Humus-/Lehm-/Tonböden; lockt Rotkehlchen an |
| Wachholder | <i>Juniperus communis</i> "Meyer" | 3-4m | mäßig trocken bis frisch, Sand/ Lehm/ Ton/ Torf |
| Gemeiner Liguster | <i>Ligustrum vulgare</i> | 3-5m | alle Böden, trocken bis feucht; radikalen Verjüngungsschnitt gut vertragend |
| Gemeine Heckenkirsche | <i>Lonicera xylosteum</i> | 2,5-3,5m | Humusböden/ sandige Lehm-/Tonböden; radikalen Verjüngungsschnitt gut vertragend |
| Gewöhnliche Traubenkirsche | <i>Prunus padus</i> | 10-15m | tiefgründige humose Ton-/Lehmböden |
| Schwarzdorn, Schlehe | <i>Purnus spinosa</i> | 4-5m | durchlässige, sandige und steinige Lehmböden |
| Kreuzdorn | <i>Rhamus catharticus</i> | 4-6m | alle trockenen, durchlässigen Böden; Verjüngungs-schnitt mit dem Alter weniger Erfolg versprechend |
| Faulbaum | <i>Rhamus frangula</i> | 2-3m | feuchte Lehm-/Tonböden; Rückschnitt nicht Erfolg versprechend |
| echte Hundsrose | <i>Rosa canina</i> | 2-3m | alkalische, durchlässige Böden - nicht zu feucht; radikalen Verjüngungs-schnitt gut vertragend |
| Weinrose | <i>Rosa rubiginosa</i> | 2-3m | durchlässige schwere Lehm-/Tonböden; radikalen Verjüngungs-schnitt gut vertragend |
| Schwarzer Holunder | <i>Sambucus nigra</i> | 5-7m | frische, humusreiche, sandige Lehm-/Tonböden; radikalen Verjüngungs-schnitt gut vertragend |
| Trauben-Holunder | <i>Sambucus racemosa</i> | 3-4m | frische Lehmböden; starker Rückschnitt nicht empfehlenswert |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|------|---|
| Eibe | <i>Taxus baccata</i> | 10m | frische, sandige/steinige, humose Lehm-/Tonböden |
| Wolliger Schneeball | <i>Viburnum lantana</i> | 3-4m | frische, trockene, durchlässige Sand-/Ton-/Lehmböden ;radikalen Verjüngungsschnitt vertragend |
| Gemeiner Schneeball | <i>Viburnum opulus</i> | 3-4m | alle feuchten, nährstoffreichen Böden;radikalen Verjüngungsschnitt vertragend |

Pflanzgröße: mindestens 125-150 cm